Sistemas de classificação e nomenclatura das rochas ígneas

Antonio Liccardo

Magma – Lava - Haváí

Paricutín - México

Magma

É uma rocha fundida (altas T: 700 até 1.200 C. Tem consistência pastosa e mobilidade (velocidade média 5-16 km/h).

Constituintes do Magma

1. **Líquido:** íons móveis: principalmente silício e oxigênio mais Al, Ca, Fe, Mg, Na, K, Mn, Ti e P
2. **Sólido:** minerais já cristalizados ou em cristalização + eventuais fragmentos de rochas IMS (Xenólitos).
3. **Voláteis** (gases dissolvidos): vapor de H_2O (75-95 %), CO_2 , SO_2 , CH_4 (metano), N + F, Cl, B

O magma resulta da fusão (altas temperaturas $> 650\text{ }^{\circ}\text{C}$) de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Esta fusão ocorre no interior da Terra (Crosta e Manto)

Solidificação (Cristalização)

- Quando o magma se solidifica (cristaliza) em profundidade ou na superfície da terra, forma-se a Rocha ÍGNEA ou MAGMÁTICA.

Vulcanismo

Quando o magma chega à superfície da terra, chama-se **LAVA** e forma vulcões.

Solidificação (Cristalização)

Lava resfriada, cristaliza-se e forma a rocha vulcânica ou extrusiva

EX: Basaltos e Riólitos

i. Rhyolite

Close up

Solidificação (Cristalização)

Quando o magma permanece e cristaliza-se no interior da terra forma-se a rocha plutônica ou intrusiva.

Ex: Gabros e Granitos

B. Gabbro

Close up

A. Granite

Close up

Fig. 16.7 As séries de reação de Bowen.

Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

Minerais Formadores de Rochas Ígneas

- Feldspatos (feldspato Alcalino e Plagioclásio)
- Quartzo
- Biotita e Muscovita
- Piroxênio e Anfibólios
- Olivina
- Feldspatóides*

FÉLSICOS

Feldspatos e quartzo:

Minerais claros

- ricos em Si e Al, Ca, Na e K
- feldspatos (FK e Pl) e quartzo

MÁFICOS

Minerais densos

- ricos em Fe e Mg
- Piroxênios, anfibólios, olivina

**Olivine (forsterite with
edge of volcanic bomb)**

— 1 cm —

Lápis-lazuli do Afeganistão
(8 cm)

Feldspatóides

- Leucita
- Nefelina
- Sodalita

Nefelina (nicóis)

Nefelina (nicóis)

Leucita (nicóis)

Leucita (nicóis)

Sodalita (nicóis)

Sodalita (nicóis)

Critérios de classificação para ROCHAS ÍGNEAS

- **A** - Profundidade de cristalização
- **B** – Estrutura*
- **C** - Textura: é o tamanho e o arranjo dos minerais constituintes da rocha
- **D** - Quantidade da Sílica (SiO_2) ~ quartzo
- **E** – Índice de Cor
- **F** – Composição: quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio
- **G** – Casos especiais

A - Classificação por Profundidade

- Vulcânicas: riolitos, dacitos, andesitos e basaltos
- Sub-vulcânicas* – microgranito, microgabro (diabásio)
- Plutônicas: granitos, granodioritos, dioritos e gabros

B – Estruturas*

- Maciça
- Orientada
- Vesicular
- Amigdaloidal

1- Maciça - isótropa

Distribuição caótica dos minerais.

Diorite

Close up

A. Granite

Close up

B. Gabbro

Close up

2- Orientada

Orientação dos minerais (amostra de mão)

Ex. sienito com estrutura fluidal

3- Vesicular

Com cavidades sem preenchimento (amostra de mão). Estas vesículas foram formadas por bolhas de gases dissolvidos no magma. Só ocorre em rochas vulcânicas

4- Amigdaloidal

Com cavidades preenchidas por minerais, Ex: quartzo (amostra de mão).
Também só ocorre em rochas vulcânicas.

C - Classificação por texturas

- Fanerítica
 - Equigranular
 - Porfirítica
- Afanítica
- Vítrea

Textura Fanerítica

É típica de rochas plutônicas em razão do resfriamento lento do magma no interior da crosta. Assim, só ocorre e é indicativa de rochas plutônicas (Ex:granito)

Pode ser fina, média, grossa.

- > 30 mm muito grossa
- 5 – 30 mm grossa
- 1 – 5 mm média
- < 1 mm fina

B. Phanerifite

Textura Porfirítica

Grãos maiores que se sobressaem em relação à uma matriz mais fina (Ex: granitos e andesitos). Pode ocorrer em rochas plutônicas e vulcânicas.

Textura Afanítica

É formada por minerais muito finos (não visíveis). É típica de rochas vulcânicas em razão do resfriamento rápido do magma (lava) na superfície (Ex: basaltos e riolitos)

B. Rhyolite

Close up

Textura vítrea

formada por vidro vulcânico (obsidiana). É típica de rochas vulcânicas.

D - Classificação por quantidade de sílica

- *Ácidas (félsicas)*: > 66% de SiO_2 (quartzo presente e visível)
- *Intermediárias* : 52 - 66% de SiO_2 (quartzo de 0 a 5%).
- *Básicas (máficas)* : 45 - 52% de SiO_2 (quartzo ausente ou muito pouco e há muitos minerais de Fe e Mg ou máficos)
- *Ultrabásicas (ultramáficas)* : < 45% de SiO_2 (quartzo ausente e há muitos minerais de Fe e Mg ou máficos).

E - Classificação por índice de cor

A cor das rochas ígneas é expressa pela % de minerais escuros presentes na rocha e dá o índice de cor **M**:

- **Leucocráticas:** 0 a 35% de minerais escuros.
- **Mesocráticas:** 35 a 65% de minerais escuros.
- **Melanocráticas:** 65 a 90% de minerais escuros.
- **Ultramáficas:** 80-100% de minerais escuros

F – Composição mineralógica - modal

- **Q** – quartzo, tridimita, cristobalita
- **A** – alkali-feldspato (ortoclásio, microclínio, pertita, anortoclásio, sanidina e albita (An0 - An5))
- **P** – plagioclásio (An5 – An100) e escapolita
- **F** – feldspatóides (nefelina, leucita, kalsilita, pseudoleucita, sodalita, cancrinita, analcima, hauynita)
- **M** – minerais máficos e correlatos (mica, anfibólios, piroxênios, olivina, opacos, epidoto, granada, melilita, monticellita, carbonatos primários)

Classificação com base no Diagrama QAPF (Q=Quartzo, A=Feldspato Alcalino, P=Plagioclásio, F= Feldspatóide)

Denominação dos campos:

- 1a Quartzolito
- 1b Granitóide rico em quartzo
- 2 Álcali-feldspato granito
- 3 Granito
- 4 Granodiorito
- 5 Tonalito
- 6 (Quartzo*) Álcali-feldspato sienito
- 7 (Quartzo*) Sienito
- 8 (Quartzo*) Monzonito
- 9 (Quartzo*) Monzodiorito ou monzogabro
- 10 (Quartzo*) Diorito ou gabro
- 6' Álcali-feldspato sienito com feldspatóide
- 7' Sienito com feldspatóide
- 8' Monzonito com feldspatóide
- 9' Monzodiorito ou monzogabro com feldspatóide
- 10' Diorito ou gabro com feldspatóide
- 11 Feldspatóide sienito
- 12 Feldspatóide monzossienito
- 13 Feldspatóide monzodiorito
- 14 Feldspatóide diorito ou gabro
- 15 Foidolito

Fig. 16.13 Diagrama QFAP da Sistemática da IUGS para classificação de rochas ígneas com índice de Cor (M) < 90. Q quartzo; F feldspatóide; A feldspato alcalino; P plagioclásio.

Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

Uso do gráfico QAPF e nomenclatura

- Adequado para rochas plutônicas e vulcânicas
- $Q+A+P+F= 100\%$ - Q e F se excluem mutuamente
- Nome raiz pode receber prefixos complementares
- Não existe um gráfico único para todas as rochas ígneas
- Minerais escuros são excluídos para efeito de classificação
 - Ex – rocha com $Q=10\%$, $A=30\%$, $P=20\%$ e $M= 40\%$
 - Valores são recalculados para:
 - $Q= 100 \times 10 / 60 = 16,7\%$
 - $A= 100 \times 10 / 60 = 50\%$
 - $P= 100 \times 20 / 60 = 33,3\%$
 - Nome da rocha – **QUARTZO-MONZONITO** (campo 8)

Denominação dos campos:

- 1a Quartzolito
- 1b Granitóide rico em quartzo
- 2 Álcali-feldspato granito
- 3 Granito
- 4 Granodiorito
- 5 Tonalito
- 6 (Quartzo*) Álcali-feldspato sienito
- 7 (Quartzo*) Sienito
- 8 (Quartzo*) Monzonito
- 9 (Quartzo*) Monzodiorito ou monzogabro
- 10 (Quartzo*) Diorito ou gabro
- 6' Álcali-feldspato sienito com feldspatóide
- 7' Sienito com feldspatóide
- 8' Monzonito com feldspatóide
- 9' Monzodiorito ou monzogabro com feldspatóide
- 10' Diorito ou gabro com feldspatóide
- 11 Feldspatóide sienito
- 12 Feldspatóide monzossienito
- 13 Feldspatóide monzodiorito
- 14 Feldspatóide diorito ou gabro
- 15 Foidolito

Fig. 16.13 Diagrama QFAP da Sistemática da IUGS para classificação de rochas ígneas com Índice de Cor (M) < 90. Q quartzo; F feldspatóide; A feldspato alcalino; P plagioclásio.

Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

Para plotar uma rocha com a composição: 70% X, 20% Y, e 10% Z em diagrama triangular

Casos especiais

- Rochas piroclásticas
- Rochas piroclásticas-epiclásticas
- Carbonatitos
- Rochas lamprofíricas
- Rochas melilíticas
- Rochas charnoquíticas
- Rochas ultramáficas
- Classificação química (TAS – *total alkali silica*)

Classification of the pyroclastic rocks.

a. Based on type of material. After Pettijohn (1975) *Sedimentary Rocks*, Harper & Row, and Schmid (1981) *Geology*, **9**, 40-43.

b. Based on the size of the material. After Fisher (1966) *Earth Sci. Rev.*, **1**, 287-298.

(a)

(b)

Rochas
piroclásticas e
mistas
(piroclásticas-
epiclásticas)

Table B.1. Classification and nomenclature of pyroclasts and well-sorted pyroclastic deposits based on clast size (after Schmid, 1981, Table 1).

Clast size in mm.	Pyroclast	Pyroclastic deposit	
		Mainly unconsolidated: tephra	Mainly consolidated: pyroclastic rock
64	bomb, block	agglomerate bed of blocks or bomb, block tephra	agglomerate pyroclastic breccia
	lapillus	layer, bed of lapilli or lapilli tephra	lapilli tuff
2	coarse ash grain	coarse ash	coarse (ash) tuff
1/16	fine ash grain (dust grain)	fine ash (dust)	fine (ash) tuff (dust tuff)

Table B.2. Terms to be used for mixed pyroclastic-epiclastic rocks (after Schmid, 1981, Table 2).

Average clast size in mm.	Pyroclastic	Tuffites (mixed pyroclastic -epiclastic)	Epiclastic (volcanic and/or nonvolcanic)
64	Agglomerate, pyroclastic breccia	Tuffaceous conglomerate, tuffaceous breccia	Conglomerate, breccia
	Lapilli tuff		
2			
1/16	coarse (Ash) tuff	Tuffaceous sandstone	Sandstone
	fine	Tuffaceous siltstone	Siltstone
1/256		Tuffaceous mudstone, shale	Mudstone, shale
Amount pyroclastic material	100% to 75%	75% to 25%	25% to 0%

Rochas ultramáficas

Rochas gabróicas

(b)

Rochas vulcânicas

Carbonatitos

Fig. B.2. Chemical classification of carbonatites using wt% oxides (Woolley & Kempe, 1989).

Lamprófiros

Table B.3. Classification and nomenclature of lamprophyres based on their light-coloured minerals, alkali feldspar (or), plagioclase (pl), feldspar (feld) and feldspathoid (foid) (after Streckeisen, 1978, p.11). The characteristic mafic minerals are also listed.

Light-coloured constituents		Predominant mafic minerals			
feldspar	foid	biotite, diopsidic augite, (±olivine)	hornblende, diopsidic augite, (±olivine)	amphibole, (barkevikite, kaersutite), Ti-augite, olivine,biotite	melilite, biotite, ±Ti-augite, ±olivine, ±calcite
or > pl	—	minette	vogesite	—	—
pl > or	—	kersantite	spessartite	—	—
or > pl	feld > foid	—	—	sannaite	—
pl > or	feld > foid	—	—	camptonite	—
—	glass or foid	—	—	monchiquite	poizenite
—	—	—	—	—	alnöite

Rochas melilíticas

Fig. B.3. Classification and nomenclature of melilitic igneous rocks based on melilitite (Mel), olivine (Ol), and clinopyroxene (Cpx) (after Streckeisen, 1978, Fig. 5).

Charnoquitos

Table B.4. Special terms used for charnockitic rocks (from Streckeisen, 1974, p355).

QAPF field	General term	Special term
2	hypersthene alkali feldspar granite	alkali feldspar charnockite
3	hypersthene granite	charnockite (3b farsundite)
4	hypersthene granodiorite	opdalite or charno-enderbite
5	hypersthene tonalite	enderbite
6	hypersthene alkali feldspar syenite	—
7	hypersthene syenite	—
8	hypersthene monzonite	mangerite
9	monzonorite (hypersthene monzodiorite)	jotunite
10	norite (hypersthene diorite), anorthosite (M<10)	—

Fig. 16.9 As relações entre Índice de cor, teor de sílica, composição mineralógica e ambiente de cristalização para as rochas ígneas mais comuns (excluindo as alcalinas).

Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

A chemical classification of volcanics based on total alkalis vs. silica. After Le Bas *et al.* (1986) *J. Petrol.*, **27**, 745-750. Oxford University Press.

Para saber mais

- **Decifrando a Terra**

Teixeira, Toledo, Fairchild & Taioli – Ed. Oficina de Textos

- **Para Entender a Terra**

Press, Siever, Grotzinger e Jordan – Ed. Bookman

- **Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms**

Le Maitre, R.W. e outros. Blackwell Scientific Publications. London, 1989.

- **Petrography of igneous and metamorphic rocks**

Philpotts, A.R.. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall. 1998

- **Petrografia Macroscópica das Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas**

Sgarbi, G.N.C. belo Horizonte UFMG. 2007.